

veralife VERA ZINC

CAPSULES AND ORAL SYRUP



Product Description:

Veralife Vera Zinc contains zinc, an essential trace element involved in several physiological functions. Zinc contributes to normal immune function, normal growth and development, maintenance of normal skin, hair and nails, normal fertility and reproduction, and protection of cells from oxidative stress.

Composition:

* Capsules:

Each capsule contains:

Zinc elemental 50 mg

(as zinc oxide 25 mg and zinc citrate 25 mg)

Other ingredients:

Maltodextrin, magnesium stearate.

* Oral Syrup:

Each 5 ml contains:

Zinc elemental 18 mg

(as zinc sulfate 50 mg)

Other ingredients:

Sugar, sorbitol 70%, glycerin, trisodium citrate dihydrate, sodium benzoate, sucralose, citric acid, raspberry flavor.

Indications of Use:

- Support of normal immune function.
- Support of normal growth and development.
- Support of normal skin, hair and nails.
- Support of normal fertility and reproduction.
- Prevention and correction of zinc deficiency.

Directions for Use:

Veralife Vera Zinc Capsules:

Adults: One capsule daily with food.

Veralife Vera Zinc Syrup:

• The recommended dose:

For Children:

* 4 to 8 years old: 3 ml.

For Adolescent:

* 9 to 13 years old: 5 ml.

* 14 to 18 years old: 8 ml.

• Take Veralife Vera Zinc with food if it upsets your stomach.

Warnings:

- Keep out of reach of children.
- Do not exceed the recommended daily dose.
- Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
- Consult a healthcare professional before use if you are pregnant, breastfeeding, taking other medicines, or have a medical condition.
- Inform your doctor or pharmacist if you have any allergy or a history of copper deficiency.

Possible Side Effects:

In some individuals, zinc may cause nausea, vomiting, stomach upset, heartburn, or gastritis, especially when taken on an empty stomach.

Interactions:

Zinc may reduce the absorption of tetracycline antibiotics when taken at the same time. Separate administration by at least 3 hours.

Overdose:

Symptoms of overdose may include severe nausea, vomiting, dizziness, fainting, and shortness of breath. If overdose is suspected, contact a physician immediately.

Storage Condition:

- Do not store above 30°C.
- Store in the original packaging.
- Keep in a dry place away from light and heat.

وصف المنتج :

يحتوي فيراليف فيرا زنك على عنصر الزنك، وهو عنصر أساسي يشارك في عدة وظائف فسيولوجية. يساهم الزنك في دعم الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي، والنمو والتطور الطبيعي، والمحافظة على صحة الجلد والشعر والأظافر، والخصوبة والتكاثر الطبيعي، وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

المكونات :

كبسولات فيراليف فيرا زنك:

كل كبسولة تحتوي على:

٥٠ ملغ من الزنك.

شراب فيراليف فيرا زنك:

كل ٥ مل تحتوي على:

١٨ ملغ من الزنك.

دواعي الاستعمال :

دعم الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي.

دعم النمو والتطور الطبيعي.

المحافظة على صحة الجلد والشعر والأظافر.

دعم الخصوبة والتكاثر الطبيعي.

الوقاية من نقص الزنك وتصحيحه.

طريقة الاستعمال :

كبسولات فيراليف فيرا زنك:

للبالغين فقط: كبسولة واحدة يوميًا مع الطعام.

شراب فيراليف فيرا زنك:

الجرعة الموصى بها:

للأطفال:

* من ٤ إلى ٨ سنوات: ٣ مل.

للمراهقين:

* من ٩ إلى ١٣ سنة: ٥ مل.

* من ١٤ إلى ١٨ سنة: ٨ مل.

تناول فيراليف فيرا زنك مع الطعام إذا سبب اضطرابًا في المعدة.

التحذيرات :

• يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

• لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.

• لا ينبغي استخدام المكملات الغذائية كبديل عن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع ونمط الحياة الصحي.

• استشر مقدم الرعاية الصحية قبل الاستعمال في حال الحمل أو الرضاعة أو تناول أدوية أخرى أو وجود حالة مرضية.

• أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك أي حساسية أو تاريخ من نقص النحاس.

الأثار الجانبية المحتملة :

قد يسبب الزنك لدى بعض الأشخاص غثيانًا أو قيئًا أو اضطرابًا في المعدة أو حرقة أو التهابًا في المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

التداخلات الدوائية :

قد يقلل الزنك من امتصاص المضادات الحيوية من مجموعة التتراسيكلين عند تناولهما في الوقت نفسه. يجب الفصل بينهما لمدة لا تقل عن ٣ ساعات.

الجرعة الزائدة :

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة غثيانًا شديدًا، وقيئًا، ودوخة، وإغماء، وضيقًا في التنفس. في حال الاشتباه بحدوث جرعة زائدة، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

ظروف التخزين :

• يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز ٣٠°م.

• يحفظ داخل عبوته الأصلية.

• يحفظ في مكان جاف بعيدًا عن الضوء والحرارة.



(30°C)